



NALTREXONE (REVIA)

DOCUMENT EXPLICATIF

- Ce médicament vous est prescrit par votre médecin pour diminuer le risque de rechute pour votre trouble d'usage d'alcool.
- Il est pris 1 fois par jour, le matin. Il est important de respecter la posologie inscrite sur l'étiquette. Ne pas en utiliser plus, ni plus souvent qu'indiqué.
- Vous devez savoir que ce médicament vous est prescrit pour une période de 6 mois initialement. Il peut être prolongé selon son efficacité et sa tolérance.
- Vous ne pouvez pas prendre des calmants tel que Morphine, Dilaudid ou Codéine pendant la prise de cette médication. Si vous avez une condition médicale qui nécessite un soulagement de la douleur avec des médicaments opioïdes, cesser le Naltrexone et aviser votre pharmacien, infirmière ou médecin traitant de votre condition.

Voici les effets secondaires possibles :

- Nausées, vomissements, diminution de l'appétit
 - Anxiété
 - Maux de têtes
-
- Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Si vous pensez que ce produit est la cause d'un problème qui vous incommoder, qu'il soit mentionné ici ou non, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Il est possible que votre médecin vous demande des prises de sang de suivi. N'oubliez pas d'aller les faire!

 Prochaine prise de sang : **Un mois** après le début de la médication

 Prochain rendez-vous de suivi : _____