



DIAZEPAM (VALIUM)

DOCUMENT EXPLICATIF

- Ce médicament est utilisé pour **diminuer les symptômes de sevrage** tels que les tremblements, la sudation, l'anxiété, l'irritabilité, la soif intense ou le goût de consommer.
- Il peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il est très important de respecter l'ordonnance ou les consignes données par le médecin et/ou l'infirmière.
- On peut ressentir son effet en moins de 30 minutes.
- Vous devez savoir que ce médicament vous est donné à dose décroissante sur une courte période car il est possible de développer une dépendance.

Voici les effets secondaires possibles :

- Somnolence ou fatigue marquées
 - Confusion
 - Étourdissement ou vertiges (levez-vous lentement)
 - Maux de tête importants
 - Difficulté respiratoires (en cas de difficulté respiratoire importante, présentez-vous à l'urgence ou téléphoner au 911)
 - Pertes de mémoire (ne cause pas l'Alzheimer)
-
- Si vous présentez un ou des effets secondaires importants, ne prenez plus ce médicament et téléphonez à l'infirmière ou à votre médecin.
 - Il est important que vous sachiez que ce médicament peut entraîner de la somnolence et de la confusion. Vous devez donc attendre 2 heures après sa prise avant de conduire un véhicule. Ne prenez pas le volant si vous vous sentez somnolent.
 - Évitez de prendre de l'alcool avec ce médicament, car il peut augmenter l'apparition d'effets secondaires.
 - Ne prenez pas de médicaments en vente libre ou de produits naturels sans en discuter d'abord avec votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez du Diazepam.
 - Vos médicaments ont été prescrits pour vous et votre problème de santé. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre.
 - Informez tout professionnel de la santé si vous prenez ce médicament présentement.
 - Conservez ce produit dans un endroit sécuritaire hors de la portée des enfants; et assurez-vous qu'il n'est pas exposé à de la chaleur ou de l'humidité excessive.
 - Rapportez les comprimés qu'il vous reste à votre pharmacien.