

Formulations de naloxone disponibles au Canada

| Produit | <u>Naloxone</u> Chlorhydrate de naloxone injectable — Fiole | <u>Naloxone</u> Chlorhydrate de naloxone injectable — Ampoule | <u>Narcan</u> ^{MC} Vaporisateur nasal | <u>Evzio</u> ^{MC} Auto-injecteur (pas encore approuvé au Canada) |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Image |  |  |  |  |
| Voie d'administration | Intramusculaire (IM) | Intramusculaire (IM) | Intranasale (IN) | Intramusculaire (IM) |
| Force/concentration | 0,4 mg/mL | 0,4 mg/mL | 4 mg/0,1 mL | 2 mg/0,4 mL |
| Format | Format de 10 fioles de 1 mL | <ul style="list-style-type: none"> Format de 10 ampoules de 1 mL Les trousse PROFAN contiennent 2 ampoules de 1 mL | Format de 2 vaporisateurs nasaux à usage unique | Format de 2 auto-injecteurs + 1 dispositif de formation |
| Posologie | Injecter 1 mL (0,4 mg) de naloxone par voie IM (épaule ou cuisse). Répéter après 3 à 5 minutes PRN | Injecter 1 mL (0,4 mg) de naloxone par voie IM (épaule ou cuisse). Répéter après 3 à 5 minutes PRN | Vaporiser le contenu du dispositif (0,1 mL) dans une narine. Répéter dans l'autre narine après 3 à 5 minutes au besoin. | En suivant les instructions auditives du dispositif, injecter le contenu de celui-ci dans la cuisse. Maintenir en place 5 à 10 secondes. Répéter après 3 à 5 minutes avec un 2 ^e dispositif au besoin. |

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|
| Manipulations | Injecter 1 mL d'air dans la fiole. Puis, prélever le contenu total de la fiole avec une seringue de 3 mL avec aiguille rétractable de 1 pouce (21, 22 ou 23 G) avant utilisation. | Prélever le contenu total de l'ampoule avec une seringue de 3 mL avec aiguille rétractable de 1 pouce (21, 22 ou 23 G) avant utilisation. | Retirer le vaporisateur de sa plaquette protectrice avant utilisation. | Suivre les instructions auditives du dispositif. |
| Conservation | <ul style="list-style-type: none"> • Température pièce (entre 15 et 30°C) • À l'abri de la lumière | <ul style="list-style-type: none"> • Température pièce (entre 15 et 30°C) • À l'abri de la lumière | <ul style="list-style-type: none"> • Température pièce (entre 15 et 25°C) • Excursion temporaire permise (entre 4 et 40°C) • À l'abri de la lumière • Conserver le vaporisateur dans sa plaquette protectrice scellée jusqu'à utilisation. | <ul style="list-style-type: none"> • Température pièce (entre 15 et 25°C) • Excursion temporaire permise (entre 4 et 40°C) • À l'abri de la lumière |
| Coût | Gratuit via le programme de gratuité (29.29\$ pour 2 fioles sans l'honoraire du pharmacien) | Gratuit via le programme de gratuité et certains programmes de santé publique (29.29\$ pour 2 ampoules sans l'honoraire du pharmacien) | 145\$ pour 2 doses de 4mg (sans l'honoraire du pharmacien) | Non disponible au Canada |
| Couverture RAMQ | Oui | Oui | Non couvert | N/A |
| DIN | <ul style="list-style-type: none"> • 02455935 • Pseudo-DIN des seringues avec aiguille rétractable couvertes par la RAMQ : 99101335 | <ul style="list-style-type: none"> • 02453258 • Pseudo-DIN des seringues avec aiguille rétractable couvertes par la RAMQ : 99101335 | 02458187 | N/A |
| Manufacturier | Oméga | Plusieurs manufacturiers | Adapt Pharma | Kaléo |

Références :

Adapt pharma, inc. Narcan^{MC}. Information de produit. 2017. Disponible à : <https://www.narcan.com/>

Direction régionale de santé publique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Naloxone communautaire : 5 étapes pour sauver une vie : guide à l'intention des intervenants communautaires visant l'offre d'une intervention brève aux personnes utilisatrices d'opioïdes. 2016. Disponible à :

https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-550-76256-0.pdf

DSP de Montréal. Naloxone communautaire : Ordonnance collective pour la distribution de naloxone. Mai 2015. Disponible à :

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Infections_et_intoxications/Naloxone_communautaire/OC_naloxone_communautaire_v.f2016-06-16.pdf

INESSS. Ordonnance collective nationale : Initier la naloxone pour le traitement d'une surdose aux opioïdes. Avril 2017. Disponible à :

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Naloxone/INESSS_-_Ordonnance_collective-Naloxone2.pdf

Kaléo, inc. Evzio^{MC} Auto-injecteur de naloxone. Information de produit. 2017. Disponible à :

<https://www.evzio.com/patient/about-evzio/index.php>

Laboratoires Oméga Limitée. Chlorhydrate de naloxone injection. Information de produit. 2017. Disponible à :

<http://www.omegalaboratory.com/files/8114/9142/6509/NaloxoneNoPR-FR.pdf>

Prescribe To Prevent. Naloxone Product Comparison. 2017. Disponible à :

http://prescribetoprevent.org/wp2015/wp-content/uploads/Naloxone-product-chart.17_04_14.pdf

Sandoz Canada Products. Chlorhydrate de naloxone. Disponible à :

http://www.hexal-elements.de/sandoz_ca/index.php?page=6&suche=&topic=category&category=parent

Auteur(e)s :

Catherine D. Messier, Camille Benoit, Marilie Vaillancourt et Philippe Arbour,

étudiant(e)s finissant(e)s de pharmacie

Université de Montréal

Révisé par :

Dre Marie-Ève Goyer, médecin de famille;

Félice Saulnier, pharmacienne;

Kathy Tremblay, chargée de projet CPMD, Institut universitaire sur les dépendances, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal